

Lathamapparat

1. Indikation

- bei bds. LKGNF mit weit vorstehendem Zwischenkiefer

2. OP und postoperative Versorgung

- OP erfolgt 8-10 Wochen vor der SGVK-Bildung (Alter in der Regel ca. 3- 5 Monate)
- Stationäre Aufnahme ist geplant 1 Tag vor OP
- keine Blutentnahme vor OP nötig
- OP- Dauer: ca. 1 Std.
- Antibiotikagabe für 3 Tage, erst intravenöse dann orale Gabe
- Infusionstherapie zum Flüssigkeitsausgleich
- Schmerztherapie: intravenös, sowie zusätzlich 3x täglich Ibuprofen (Zäpfchen oder Saft)

3. Ernährung nach OP

- flüssige Kost (keine Säure), Muttermilch (Stillen ist erlaubt)
- Saugen ist erlaubt
- in den ersten Tagen besser Nahrung in den Mund spritzen (z.B. mit Fingerfeeder > geringerer Druck > weniger Schmerzen)

4. Sonstiges

- Oberkörperhochlagerung (zur Erleichterung der Atemsituation und zur besseren Abschwellung des Wundgebiets)
- Bauchlage möglichst vermeiden (nur bei reinen Bauchschläfern ggf. nach Rücksprache erlaubt)
- spezielle Reinigung ist nicht erforderlich, ggf. nach Breikost nachtrinken lassen
- kein Schmusetuch > Gefahr des Verfangens in der Apparatur ist zu hoch
- Während des stationären Aufenthalts werden die Eltern in der MKG-Praxis angeleitet, die Apparatur zu verstellen
- Wiedervorstellung in der MKG-Praxis > wöchentlich über 8 Wochen
- > zur Kontrolle und Neueinstellung der Apparatur